









# DNB Mathématiques - Fiche mémo

Objectif	Contexte	J'utilise	Exemple
Déterminer une longueur dans un triangle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Triangle rectangle</li> <li>- On connaît 2 longueurs sur 3</li> </ul>	Théorème de <b>Pythagore</b> (sens direct)	<p>Le triangle <math>ABC</math> est rectangle en <math>A</math>, d'après le théorème de Pythagore :</p> $BC^2 = AB^2 + AC^2$ $BC^2 = 8^2 + 15^2$ $BC^2 = 289 \quad BC \text{ est une longueur donc } BC > 0$ <p>Donc : <math>BC = \sqrt{289} = 17 \text{ cm}</math></p> 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Triangle rectangle</li> <li>- On connaît 1 longueur</li> <li>- On connaît 1 angle</li> </ul>	<b>Trigonométrie</b> SOH CAH TOA	<p>Le triangle <math>DEF</math> est rectangle en <math>E</math></p> $\sin(\widehat{EFD}) = \frac{DE}{DF} \quad \frac{\sin(40^\circ)}{1} = \frac{DE}{6}$ $DE = 6 \times \sin(40^\circ) \simeq 3,9 \text{ cm}$ 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Configuration de Thalès (emboîtés ou papillon)</li> <li>- Droites parallèles</li> </ul>	Théorème de <b>Thalès</b> (sens direct)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">  <div style="text-align: center;"> <p>- Les droites <math>(BC)</math> et <math>(DE)</math> sont sécantes en <math>A</math></p> <p>- <math>(BD) \parallel (CE)</math></p> <p>Théorème de Thalès : <math>\frac{AB}{AC} = \frac{AD}{AE} = \frac{BD}{CE}</math></p> <p>- On remplace les longueurs connues</p> <p>- Longueurs manquantes : produits en croix</p> </div>  </div>
Déterminer un angle dans un triangle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- On connaît 2 angles sur 3</li> </ul>	Somme des mesures des angles vaut $180^\circ$	<p>La somme des mesures des angles dans un triangle vaut <math>180^\circ</math></p> $\widehat{STR} = 180^\circ - \widehat{SRT} - \widehat{RST}$ $\widehat{STR} = 180^\circ - 60^\circ - 85^\circ$ $\widehat{STR} = 35^\circ$ 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Triangle rectangle</li> <li>- On connaît au moins 2 longueurs</li> </ul>	<b>Trigonométrie</b> SOH CAH TOA	<p><math>ABC</math> est rectangle en <math>A</math> <math>\cos(\widehat{ABC}) = \frac{AB}{BC} = \frac{4,5}{9}</math></p> <p>Donc : <math>\widehat{ABC} = \text{Arccos}\left(\frac{4,5}{9}\right) = 60^\circ</math></p> 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deux triangles avec des mesures deux à deux proportionnelles</li> </ul>	<b>Triangles semblables</b>	<p>Grand : <math>\frac{DF}{BC} = \frac{12}{8} = \frac{2}{3}</math>      Petit : <math>\frac{DE}{AC} = \frac{7,5}{5} = \frac{2}{3}</math></p> <p>Moyen : <math>\frac{FE}{AB} = \frac{9}{6} = \frac{2}{3}</math>      <math>\rightarrow</math> Triangles semblables</p> <p><math>\widehat{ABC} = \widehat{DFE} = 45^\circ</math> car angles homologues.</p> 

Objectif	Contexte	J'utilise	Exemple
Montrer que des droites sont parallèles	- Des droites perpendiculaires	<b>Propriété :</b> Droites perpendiculaires à une <b>même</b> droite	<u>On a :</u> $(AB) \perp (RS)$ et $(CD) \perp (RS)$ <u>Or :</u> Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite alors elles sont parallèles entre elles. <u>Donc :</u> $(AB) \parallel (CD)$  → Souvent utilisé avant d'appliquer le théorème de Thalès
	- Configuration de Thalès	Théorème de <b>Thalès</b> Réciproque / Contraposée	 - Les droites $(BC)$ et $(DE)$ sont sécantes en $A$ <u>D'une part :</u> $\frac{AB}{AC} = \dots$ <u>D'autre part :</u> $\frac{AD}{AE} = \dots$  Rapports égaux : réciproque → Droites parallèles Rapports <b>non</b> égaux : contraposée → Droites <b>non</b> parallèles
Montrer qu'il y a un angle droit	- Des droites parallèles	<b>Propriété :</b> Droites parallèles alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre	<u>On a :</u> $(AB) \parallel (CD)$ et $(AB) \perp (RS)$ <u>Or :</u> Si deux droites sont parallèles alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre <u>Donc :</u> $(CD) \perp (RS)$
	- <b>Triangles rectangle</b> - On connaît toutes les longueurs	Théorème de <b>Pythagore</b> Réciproque / Contraposée	Côté le plus long : $[BC]$ <u>D'une part :</u> $BC^2 = 17^2 = 289$ <u>D'autre part :</u> $AB^2 + AC^2 = 8^2 + 15^2 = 289$ <u>On a :</u> $BC^2 = AB^2 + AC^2$  <u>Donc :</u> d'après la réciproque du théorème de Pythagore $ABC$ est rectangle en $A$ .  Si pas d'égalité : contraposée → Triangle non rectangle

Périmètre		Aire		Volume	
<u>Carré :</u>	$4 \times c$	<u>Carré :</u>	$c \times c = c^2$	<u>Cube :</u>	$c^3$
<u>Rectangle :</u>	$2 \times L + 2 \times l = 2(L + l)$	<u>Rectangle :</u>	$L \times l$	<u>Pavé droit :</u>	$L \times l \times h$
<u>Cercle :</u>	$\pi \times 2r$ ou $\pi \times d$	<u>Disque :</u>	$\pi \times r^2$	<u>Triangle :</u>	$\frac{b \times h}{2}$
				<u>Prisme :</u>	$\mathcal{A}_{base} \times h$
				<u>Cylindre :</u>	$\pi \times r^2 \times h$